

Приложение 6

Как готовить и хранить рабочий раствор дезсредства

Рабочие растворы дезсредств можно приготовить двумя способами: централизованным или децентрализованным.

При централизованном способе рабочий раствор готовят в выделенном хорошо проветриваемом помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией (п. 125.4 СанПин 3686-21).

В помещении запрещено: хранить личные вещи и пищевые продукты; принимать пищу и курить; присутствовать посторонним.

При децентрализованном способе рабочий раствор готовят в лечебно-диагностических кабинетах. Место, где готовят рабочий раствор дезсредств, оснащают местным вытяжным устройством.

Выбор способа приготовления рабочего раствора зависит от мощности организации и видов оказываемых ею услуг.

Чтобы микроорганизмы не приобретали устойчивость к дезинфектантам, по возможности не превышайте рекомендуемые нормы действующего вещества в растворе. Рекомендуемые минимальные концентрации действующих веществ – в таблице 2.

Таблица 2. Минимальная концентрация действующего вещества в рабочем растворе

Химические соединения	Рекомендуемая минимальная концентрация рабочего раствора по действующему веществу, %
ЧАС	0,02
Производные гуанидинов	0,05
Третичные алкиламины	0,01
Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты	0,015
Перекись водорода	3,0