


тонку голку розміру 23G або меншу. Після введення вакцини сильно натисніть на місце уколу і тримайте 2 хв. Не розтирайте. Персонал, який робить щеплення, має поінформувати вас про ризик розвитку гематоми.



СТАРШІ ЗА 65 РОКІВ

Старші люди частіше тяжко хворіють та отримують ускладнення внаслідок COVID-19, тому мають вакцинуватися передусім. До того ж вони легше переносять вакцинацію. Якщо щепитиметеся вакциною AstraZeneca, побічні ефекти можуть з'явитися після першої дози, якщо Covishield/Pfizer-BioNTech — після другої. Порадьтеся із сімейним лікарем, якщо маєте хронічні захворювання.

Люди з хронічними захворюваннями тяжче переносять COVID-19, тому потребують захисту, який дає вакцина. Обов'язково повідомте лікаря, який оглядає вас перед щепленням, про хронічні хвороби та будь-які алергійні реакції. Пам'ятайте, що змішувати вакцини не можна. Щепіться двома дозами одного препарату.




Назва дитячого садка:

Адреса:

e-mail:

Що потрібно знати про протипоказання до вакцинації проти COVID-19



Основні протипоказання до щеплення проти COVID-19 — тяжка алергічна реакція на першу дозу вакцини, наприклад анафілактичний шок, і температура тіла понад 38,0 °C. Якщо вживаєте лікарські засоби, що впливають на роботу імунної системи, або сумніваєтеся щодо стану вашого здоров'я, порадьтеся з лікарем загальної практики — сімейної медицини (*дали* — сімейний лікар).



ЯКЩО ВИ ВАГІТНІ АБО ГОДУЄТЕ ГРУДЬМИ

Порадьтеся із сімейним лікарем, якщо маєте високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад працюєте в ковідній лікарні, та/або хронічні захворювання. Якщо користь від щеплення перевищує ризики, **вакцинуйтеся мРНК-вакциною** — Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Якщо отримали першу дозу векторною вакциною AstraZeneca/Covishield/SKBio, то порадьтеся з лікарем щодо другої. Ви можете отримати її вже після пологів.

Робити тест на вагітність перед щепленням не потрібно.

Якщо годуєте грудьми, щепіться вакцинами Covishield/Pfizer-BioNTech та AstraZeneca будь-якого виробника. Препарат CoronaVac/Sinovac Biotech заборонений для жінок, які годують грудьми.



МАЄТЕ АЛЕРГІЮ

Ознайомтеся зі складом вакцини на сайті Державного експертного центру МОЗ України dec.gov.ua або на [vaccination.covid19.gov.ua](https://covid19.gov.ua). Якщо маєте алергію на один із компонентів, не щепіться цією вакциною.

Маєте сезонну чи побутову алергію — вакцинуються будь-яким препаратом. За полінозу чи алергічного риніту можете щепитися навіть у період загострення.



ХВОРІ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ЧИ ДІАБЕТ

SARS-CoV-2 уражає дрібні судини, що під час діабету і так ослаблені, тому перебіг захворювання буде тяжчим. Проконсультуйтеся із сімейним лікарем, як вакцина взаємодіятиме з лікарськими засобами, які ви вживаєте.

Якщо хворі на бронхіальну астму, не вакцинуються під час загострення захворювання. Відвідайте сімейного лікаря. Він може призначити вам лікарські засоби, що блокують цей процес. Від-

так зробіть щеплення. У день вакцинації не перебувайте на сонці. **Не припиняйте прийом ліків**, які вживаєте постійно.



ВІЛ-ПОЗИТИВНІ ЧИ ОНКОХВОРІ

Вакцинуються будь-якою доступною вакциною, адже ви в групі ризику й можете важко перенести COVID-19. Вакцини не спричиняють захворювання навіть на тлі імунодефіциту, бо не містять живого вірусу. Утім, якщо проходить курс імуносупресивної терапії, вакцина може не подіяти. Тому **запитайте в сімейного лікаря**, коли ліпше вакцинуватися. Якщо ще не почали лікуватися, то за два тижні до початку імуносупресивної терапії зробіть щеплення.



МАЄТЕ АУТОІМУННЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЧИ ПОРУШЕННЯ ЗГОРТАННЯ КРОВІ

За аутоімунних захворювань COVID-19 може бути смертельним, тому вакцинуватися потрібно. Проте імунна відповідь на вакцину може бути слабшою.

При порушенні згортання крові для щеплення потрібно **використовувати**